

**VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE**  
**FAKULTA INFORMATIKY A STATISTIKY**  
Katedra statistiky a pravděpodobnosti

# **STATISTIKA**

**VZORCE PRO 4ST201**

*verze 2.1*  
*poslední aktualizace: 22.9.2008*

©KSTP 2008

# Popisná statistika

$$p_i = \frac{n_i}{n} \quad \sum_{i=1}^k n_i = n \quad \sum_{i=1}^k p_i = 1 \quad i = 1, 2, \dots, k$$

$$\tilde{x}_p \quad n \cdot \frac{P}{100} < z_p < n \cdot \frac{P}{100} + 1 \quad n p < z_p < n p + 1$$

$$n \frac{P}{100} + 0,5 = z_p \quad np + 0,5 = z_p$$

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k x_i n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} \quad \bar{x} = \sum_{i=1}^k x_i p_i$$

$$\bar{x}_H = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i}} \quad \bar{x}_H = \frac{\sum_{i=1}^k n_i}{\sum_{i=1}^k \frac{n_i}{x_i}} \quad \bar{x}_H = \frac{1}{\sum_{i=1}^k \frac{p_i}{x_i}}$$

$$\bar{x}_G = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^n x_i} = \sqrt[n]{x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n} \quad \bar{x}_G = \sqrt[n]{\prod_{i=1}^k x_i^{n_i}} = \sqrt[n]{x_1^{n_1} \cdot x_2^{n_2} \cdot \dots \cdot x_k^{n_k}}$$

$$R = x_{\max} - x_{\min}$$

$$s_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n} \quad s_x^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2}{n} - \left( \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n x_i \right)^2$$

$$s_x^2 = \frac{\sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} \quad s_x^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = \frac{\sum_{i=1}^k x_i^2 n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} - \left( \frac{\sum_{i=1}^k x_i n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} \right)^2$$

$$s_x^2 = \sum_{i=1}^k (x_i - \bar{x})^2 p_i \quad s_x^2 = \overline{x^2} - \bar{x}^2 = \sum_{i=1}^k x_i^2 p_i - \left( \sum_{i=1}^k x_i p_i \right)^2$$

$$s_x^2 = \overline{s^2} + s_{\bar{x}}^2 = \frac{\sum_{i=1}^k s_i^2 n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} + \frac{\sum_{i=1}^k (\bar{x}_i - \bar{x})^2 n_i}{\sum_{i=1}^k n_i} \quad \bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^k \bar{x}_i n_i}{\sum_{i=1}^k n_i}$$

$$s_x^2 = \sum_{i=1}^k s_i^2 p_i + \sum_{i=1}^k (\bar{x}_i - \bar{x})^2 p_i \quad \bar{x} = \sum_{i=1}^k \bar{x}_i p_i$$

$$s_x = \sqrt{s_x^2} \quad V_x = \frac{s_x}{\bar{x}}$$

---

# Pravděpodobnost

---

## Počet pravděpodobnosti

$$P(A) = \frac{m}{n}$$

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B)$$

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) P(B)$$

$$P(A \cap B) = P(A) P(B|A) = P(B) P(A|B)$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^s P(A \cap B_i)$$

$$P(A) = \sum_{i=1}^s P(B_i) P(A|B_i)$$

## Náhodné veličiny

$$P(x) = P(X=x) \quad F(x) = P(X \leq x) = \sum_{t \leq x} P(t)$$

$$P(x_1 < X \leq x_2) = \sum_{x_1 < x \leq x_2} P(x) = F(x_2) - F(x_1)$$

$$F(x) = P(X \leq x) = \int_{-\infty}^x f(t) dt \quad f(x) = F'(x) \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$$

$$P(x_1 < X \leq x_2) = \int_{x_1}^{x_2} f(x) dx = F(x_2) - F(x_1)$$

$$x_p \quad F(x_p) = P \quad x_p = F^{-1}(P)$$

$$E(X) = \sum_x x P(x)$$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx$$

$$D(X) = \sum_x x^2 P(x) - \left[ \sum_x x P(x) \right]^2$$

$$D(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2 f(x) dx - \left[ \int_{-\infty}^{\infty} x f(x) dx \right]^2$$

$$\sigma = \sigma(X) = \sqrt{D(X)}$$

$$X_i \quad i=1, \dots, n, \quad E(X_i) = \mu, \quad D(X_i) = \sigma^2 \text{ nezávislé} \quad E(\sum X_i) = n\mu, \quad D(\sum X_i) = n\sigma^2$$

$$E\left(\frac{1}{n} \sum X_i\right) = \mu, \quad D\left(\frac{1}{n} \sum X_i\right) = \frac{\sigma^2}{n}$$

## Pravděpodobnostní rozdělení

Alternativní rozdělení  $A[\pi]$

$$P(x) = \pi^x (1 - \pi)^{1-x} \quad x = 0, 1, \quad 0 < \pi < 1$$

$$E(X) = \pi \quad D(X) = \pi(1 - \pi)$$

Binomické rozdělení  $Bi[n; \pi]$

$$P(x) = \binom{n}{x} \pi^x (1 - \pi)^{n-x} \quad x = 0, 1, 2, \dots, n, \quad n > 0, \quad 0 < \pi < 1$$

$$E(X) = n\pi \quad D(X) = n\pi(1 - \pi)$$

Poissonovo rozdělení  $Po[\lambda]$

$$P(x) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^x}{x!} \quad x = 0, 1, \dots, \quad \lambda > 0, \quad E(X) = \lambda \quad D(X) = \lambda$$

Hypergeometrické rozdělení  $Hy[N;M;n]$

$$P(x) = \frac{\binom{M}{x} \binom{N-M}{n-x}}{\binom{N}{n}}, \quad x = \max(0, M-N+n), \dots, \min(M, n), n > 0, N \geq n, M \leq N$$

$$E(X) = n \frac{M}{N} \quad D(X) = n \frac{M}{N} \left(1 - \frac{M}{N}\right) \frac{N-n}{N-1}$$

Exponenciální rozdělení  $E[A;\delta]$   $A \geq 0, \delta > 0$

$$F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq A \\ 1 - e^{-\frac{(x-A)}{\delta}} & x > A \end{cases} \quad E(X) = A + \delta \quad D(X) = \delta^2$$

Normální rozdělení  $N[\mu;\sigma^2]$

$$-\infty < x < \infty, -\infty < \mu < \infty, \sigma^2 > 0 \quad E(X) = \mu \quad D(X) = \sigma^2$$

$$u = \frac{x - \mu}{\sigma} \quad F(x) = \Phi(u) = \Phi\left(\frac{x - \mu}{\sigma}\right) \quad x_p = \mu + \sigma u_p$$

$$P(x_1 \leq X \leq x_2) = P\left(\frac{x_1 - \mu}{\sigma} \leq \frac{X - \mu}{\sigma} \leq \frac{x_2 - \mu}{\sigma}\right) = P(u_1 \leq U \leq u_2) = \Phi(u_2) - \Phi(u_1)$$

Normované normální rozdělení  $N[0;1]$

$$U = \frac{X - \mu}{\sigma} \quad E(U) = 0 \quad D(U) = 1$$

$$\Phi(u) = 1 - \Phi(-u) \quad \Phi(-u) = 1 - \Phi(u) \quad u_p = -u_{1-p}$$

Logaritmicko-normální rozdělení  $LN[\mu;\sigma^2]$

$$U = \frac{\ln X - \mu}{\sigma} \sim N[0;1] \quad x > 0, -\infty < \mu < \infty, \sigma^2 > 0$$

$$F(x) = \Phi\left(\frac{\ln x - \mu}{\sigma}\right) \quad x_p = \exp(\mu + \sigma u_p)$$

$$E(X) = e^{\mu + \sigma^2/2} \quad D(X) = e^{2\mu + \sigma^2} (e^{\sigma^2} - 1)$$

$$\mu = E(\ln X) = \ln(E(X)) - \sigma^2/2 \quad \sigma^2 = D(\ln X) = \ln\left(\frac{D(X)}{(E(X))^2} + 1\right)$$

Chí-kvadrát rozdělení  $\chi^2[v]$   $x > 0$

Rozdělení  $t$  (Studentovo)  $t[v]$   $-\infty < x < \infty$   $t_p = -t_{1-p}$

$F$  - rozdělení (Fisherovo – Snedecorovo)  $F[v_1;v_2]$   $x > 0$ ,  $F_p(v_1, v_2) = \frac{1}{F_{1-p}(v_2, v_1)}$

$$s'_x = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2}{n-1}}$$

## Odhady parametřů

**střední hodnota** est  $\mu = \hat{\mu} = \bar{x}$  est  $N\mu = N\bar{x}$

normální rozdělení

a)  $\sigma^2$  známé

$$P\left(\bar{x} - u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + u_{1-\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{x} - u_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \mu\right) = 1 - \alpha \quad P\left(\mu < \bar{x} + u_{1-\alpha} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

b)  $\sigma^2$  neznámé

$$P\left(\bar{x} - t_{1-\alpha/2} \frac{s'_x}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{x} + t_{1-\alpha/2} \frac{s'_x}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha \quad t \sim t[n-1]$$

$$P\left(\bar{x} - t_{1-\alpha} \frac{s'_x}{\sqrt{n}} < \mu\right) = 1 - \alpha \quad P\left(\mu < \bar{x} + t_{1-\alpha} \frac{s'_x}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

obecné rozdělení,  $\sigma^2$  neznámé, velký výběr ( $n > 30$ )

$$P\left(\bar{x} - u_{1-\alpha/2} \frac{s'_x}{\sqrt{n}} < E(X) < \bar{x} + u_{1-\alpha/2} \frac{s'_x}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(\bar{x} - u_{1-\alpha} \frac{s'_x}{\sqrt{n}} < E(X)\right) = 1 - \alpha \quad P\left(E(X) < \bar{x} + u_{1-\alpha} \frac{s'_x}{\sqrt{n}}\right) = 1 - \alpha$$

**rozptyl  $\sigma^2$  (normální rozdělení)** est  $\sigma^2 = \hat{\sigma}^2 = s_x'^2$

**Parametr  $\pi$  alternativního rozdělení (odhad relativní četnosti základního souboru)**

est  $\pi = \hat{\pi} = p$  est  $N\pi = Np$

$$P\left(p - u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} < \pi < p + u_{1-\alpha/2} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$P\left(p - u_{1-\alpha} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}} < \pi\right) = 1 - \alpha \quad P\left(\pi < p + u_{1-\alpha} \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}}\right) = 1 - \alpha$$

**Testování hypotéz**

**Střední hodnota normálního rozdělení**

H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	Testové kritérium	Kritický obor
$\mu = \mu_0$	$\mu > \mu_0$ $\mu < \mu_0$ $\mu \neq \mu_0$	$\sigma^2$ známé $U = \frac{\bar{x} - \mu_0}{\sigma} \sqrt{n} \quad U \sim N[0;1]$	$W_\alpha = \{U \geq u_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{U \leq -u_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{ U  \geq u_{1-\alpha/2}\}$
		$\sigma^2$ neznámé $t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s'_x} \sqrt{n} \quad t \sim t[n-1]$	$W_\alpha = \{t \geq t_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{t \leq -t_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{ t  \geq t_{1-\alpha/2}\}$

**Střední hodnota, obecné rozdělení, velký výběr**

H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	Testové kritérium	Kritický obor
$E(X) = \mu_0$	$E(X) > \mu_0$ $E(X) < \mu_0$ $E(X) \neq \mu_0$	$\sigma^2$ neznámé ( $n > 30$ ) $U = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s'_x} \sqrt{n} \quad U \approx N[0;1]$	$W_\alpha = \{U \geq u_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{U \leq -u_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{ U  \geq u_{1-\alpha/2}\}$

**Rozptyl v normálním rozdělení**

H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	Testové kritérium	Kritický obor
$\sigma^2 = \sigma_0^2$	$\sigma^2 > \sigma_0^2$ $\sigma^2 < \sigma_0^2$ $\sigma^2 \neq \sigma_0^2$	$\chi^2 = \frac{(n-1)s_x'^2}{\sigma_0^2} \quad \chi^2 \sim \chi^2[n-1]$	$W_\alpha = \{\chi^2 \geq \chi^2_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{\chi^2 \leq \chi^2_\alpha\}$ $W_\alpha = \{\chi^2 \leq \chi^2_{\alpha/2} \cup \chi^2 \geq \chi^2_{1-\alpha/2}\}$

**Parametr  $\pi$  alternativního rozdělení (velké výběry)**

H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	Testové kritérium	Kritický obor
$\pi = \pi_0$	$\pi > \pi_0$ $\pi < \pi_0$ $\pi \neq \pi_0$	$U = \frac{p - \pi_0}{\sqrt{\frac{\pi_0(1-\pi_0)}{n}}} \quad U \sim N[0;1]$	$W_\alpha = \{U \geq u_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{U \leq -u_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{ U  \geq u_{1-\alpha/2}\}$

**Rovnost středních hodnot dvou rozdělení**

normální rozdělení (nezávislé náhodné výběry z normálního rozdělení)

H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	Testové kritérium	Kritický obor
$\mu_1 = \mu_2$ $\mu_1 - \mu_2 = 0$	$\mu_1 > \mu_2$ $\mu_1 < \mu_2$ $\mu_1 \neq \mu_2$	a) $\sigma_1^2, \sigma_2^2$ známé $U = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{\sigma_1^2}{n_1} + \frac{\sigma_2^2}{n_2}}} \quad U \sim N[0;1]$	$W_\alpha = \{U \geq u_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{U \leq -u_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{ U  \geq u_{1-\alpha/2}\}$
		$\sigma_1^2, \sigma_2^2$ neznámé, ale předpokládáme, že $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$ $t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\left(\frac{(n_1-1)s_1'^2 + (n_2-1)s_2'^2}{n_1+n_2-2}\right)\left(\frac{1}{n_1} + \frac{1}{n_2}\right)}} \quad t \sim t[n_1+n_2-2]$	$W_\alpha = \{t \geq t_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{t \leq -t_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{ t  \geq t_{1-\alpha/2}\}$

	$\sigma_1^2, \sigma_2^2$ neznámé, ale předpokládáme, že $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$ $t = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1'^2}{n_1} + \frac{s_2'^2}{n_2}}} \quad t \sim t[v]$ $v = \frac{\left(\frac{s_1'^2}{n_1} + \frac{s_2'^2}{n_2}\right)^2}{\frac{1}{n_1+1}\left(\frac{s_1'^2}{n_1}\right)^2 + \frac{1}{n_2+1}\left(\frac{s_2'^2}{n_2}\right)^2} - 2$	$W_\alpha = \{t \geq t_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{t \leq -t_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{ t  \geq t_{1-\alpha/2}\}$
--	---	---

velké nezávislé výběry

H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	Testové kritérium	Kritický obor
$\mu_1 = \mu_2$ $\mu_1 - \mu_2 = 0$	$\mu_1 > \mu_2$ $\mu_1 < \mu_2$ $\mu_1 \neq \mu_2$	$\sigma_1^2, \sigma_2^2$ neznámé $U = \frac{\bar{x}_1 - \bar{x}_2}{\sqrt{\frac{s_1'^2}{n_1} + \frac{s_2'^2}{n_2}}} \quad U \approx N[0;1]$	$W_\alpha = \{U \geq u_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{U \leq -u_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{ U  \geq u_{1-\alpha/2}\}$

závislé výběry z normálního rozdělení (párový t-test)

H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	Testové kritérium	Kritický obor
$\mu_1 = \mu_2$ $\mu_1 - \mu_2 = 0$	$\mu_1 > \mu_2$ $\mu_1 < \mu_2$ $\mu_1 \neq \mu_2$	$t = \frac{\bar{d}}{s'_d} \sqrt{n} \quad t \sim t[n-1]$ $d_i = x_{1i} - x_{2i}, i=1,2,\dots,n$	$W_\alpha = \{t \geq t_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{t \leq -t_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{ t  \geq t_{1-\alpha/2}\}$

Rovnost rozptylů dvou normálních rozdělení

H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	Testové kritérium	Kritický obor
$\sigma_1^2 = \sigma_2^2$	$\sigma_1^2 > \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 < \sigma_2^2$ $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$	$F = \frac{s_1'^2}{s_2'^2} \quad F \sim F[n_1 - 1; n_2 - 1]$	$W_\alpha = \{F \geq F_{1-\alpha}\}$ $W_\alpha = \{F \leq F_\alpha\}$ $W_\alpha = \{F < F_{\alpha/2} \cup F \geq F_{1-\alpha/2}\}$

Chí-kvadrát test dobré shody

H <sub>0</sub> a H <sub>1</sub>	Testové kritérium	Kritický obor
H <sub>0</sub> : $\pi_i = \pi_{0,i} \quad i = 1, \dots, k$ H <sub>1</sub> : non H <sub>0</sub>	$G = \sum_{i=1}^k \frac{(n_i - n\pi_{0,i})^2}{n\pi_{0,i}} \quad \chi^2 \approx \chi^2[k-1]$	$W_\alpha = \{\chi^2 \geq \chi^2_{1-\alpha}\}$ $n\pi_{0,i} \geq 5$

# Analyza závislosti

## Kontingenční tabulka (r x s)

$$n_{i.} = \sum_{j=1}^s n_{ij} \quad n_{.j} = \sum_{i=1}^r n_{ij} \quad n'_{ij} = \frac{n_{i.} \cdot n_{.j}}{n} \quad n'_{ij} \geq 5$$

H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	Testové kritérium	Kritický obor
$\pi_{ij} = \pi_{i.} \cdot \pi_{.j}$ $1 \leq i \leq r$ $1 \leq j \leq s$	non H <sub>0</sub>	$G = \sum_{i=1}^r \sum_{j=1}^s \frac{(n_{ij} - n'_{ij})^2}{n'_{ij}}$ $G \approx \chi^2[(r-1)(s-1)]$	$W_\alpha = \{G \geq \chi^2_{1-\alpha}\}$

$$C = \sqrt{\frac{G}{n+G}} \quad V = \sqrt{\frac{G}{n(m-1)}}, \quad m = \min(r, s)$$

Tabulka 2 x 2

$$G = n \frac{(n_{11}n_{22} - n_{12}n_{21})^2}{n_{1.}n_{2.}n_{.1}n_{.2}}$$

## Analýza rozptylu

$$S_y = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y})^2 = S_{y,m} + S_{y,v} \quad S_{y,m} = \sum_{i=1}^k (\bar{y}_i - \bar{y})^2 n_i \quad S_{y,v} = \sum_{i=1}^k \sum_{j=1}^{n_i} (y_{ij} - \bar{y}_i)^2$$

$$P^2 = \frac{S_{y,m}}{S_y} \quad P = \sqrt{P^2}$$

H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	Testové kritérium	Kritický obor
$\mu_1 = \mu_2 = \dots = \mu_k$	non H <sub>0</sub>	$F = \frac{\frac{S_{y,m}}{k-1}}{\frac{S_{y,v}}{n-k}}$ $F \sim F[k-1; n-k]$	$W_\alpha = \{F \geq F_{1-\alpha}\}$

## Regrese a korelace

regresní přímka  $y = \beta_0 + \beta_1 x + \varepsilon$ ,  $Y = b_0 + b_1 x$       minimum $_{b_0, b_1} \sum_{i=1}^n (y_i - b_0 - b_1 x_i)^2$

$$s_{xy} = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{n} = \overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}$$

$$b_1 = b_{yx} = \frac{n \sum y_i x_i - \sum x_i \sum y_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\overline{x^2} - \bar{x}^2} = \frac{s_{xy}}{s_x^2}$$

$$b_0 = \frac{\sum y_i \sum x_i^2 - \sum y_i x_i \sum x_i}{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2} = \bar{y} - b_{yx} \bar{x}$$



Jiné regresní funkce  $Y = b_0 + b_1x + b_2x^2$   $Y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_kx_k$

$$S_y = \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 \quad S_T = \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{y})^2$$

$$s_y^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})^2 = \frac{S_y}{n} \quad s_Y^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{y})^2 = \frac{S_T}{n}$$

$$S_R = \sum_{i=1}^n (y_i - Y_i)^2 = \sum_{i=1}^n e_i^2 \quad s_{(y-Y)}^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (y_i - Y_i)^2 = \frac{S_R}{n} \quad s_R^2 = \frac{S_R}{n-p}$$

$$S_y = S_R + S_T \quad s_y^2 = s_Y^2 + s_{(y-Y)}^2$$

$$s_R = \sqrt{\frac{S_R}{n-p}} = \sqrt{s_R^2} \quad I_{yx}^2 = R^2 = \frac{S_T}{S_y} \quad I_{yx} = \sqrt{I_{yx}^2} \quad I_{ADJ}^2 = R_{ADJ}^2 = 1 - (1 - I_{yx}^2) \frac{n-1}{n-p}$$

### Test hypotézy o regresních parametrech

H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	Testové kritérium	Kritický obor
$\beta_i = 0$	$\beta_i \neq 0$	$t = \frac{b_i}{s(b_i)}$ $t \sim t[n-p]$	$W_\alpha = \{ t  \geq t_{1-\alpha/2}\}$

### Test o modelu $p = k + 1$

H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	Testové kritérium	Kritický obor
$\beta_0 = c$ $\beta_1 = 0$ ... $\beta_k = 0$	non H <sub>0</sub>	$F = \frac{\frac{S_T}{p-1}}{\frac{S_R}{n-p}}$ $F \sim F[p-1; n-p]$	$W_\alpha = \{F \geq F_{1-\alpha}\}$

### korelační koeficient

$$r_{yx} = r_{xy} = \frac{n \sum_{i=1}^n x_i y_i - \sum_{i=1}^n x_i \sum_{i=1}^n y_i}{\sqrt{n \sum_{i=1}^n x_i^2 - (\sum_{i=1}^n x_i)^2} \sqrt{n \sum_{i=1}^n y_i^2 - (\sum_{i=1}^n y_i)^2}} = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \bar{y}}{\sqrt{(x^2 - \bar{x}^2)(y^2 - \bar{y}^2)}} = \frac{s_{xy}}{s_x s_y}$$

H <sub>0</sub>	H <sub>1</sub>	Testové kritérium	Kritický obor
$\rho_{yx} = 0$	$\rho_{yx} \neq 0$	$t = \frac{r_{yx} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r_{yx}^2}}$ $t \sim t[n-2]$	$W_\alpha = \{ t  \geq t_{1-\alpha/2}\}$

## Časové řady

$$\bar{y} = \frac{\sum_{t=1}^n y_t}{n} \quad \bar{y} = \frac{\frac{1}{2}y_1 + \sum_{t=2}^{n-1} y_t + \frac{1}{2}y_n}{n-1} \quad \bar{y} = \frac{\frac{y_1+y_2}{2}d_1 + \frac{y_2+y_3}{2}d_2 + \dots + \frac{y_{n-1}+y_n}{2}d_{n-1}}{d_1 + d_2 + \dots + d_{n-1}}$$

$$\Delta_t = y_t - y_{t-1} \quad \bar{\Delta} = \frac{1}{n-1} \sum_{t=2}^n \Delta_t = \frac{y_n - y_1}{n-1}$$

$$k_t = \frac{y_t}{y_{t-1}} \quad \bar{k} = \sqrt[n-1]{k_2 k_3 \dots k_n} = \sqrt[n-1]{\frac{y_n}{y_1}}$$

### Klouzavé průměry

$$m = 2p + 1 \quad \bar{y}_t = \frac{\sum_{i=-p}^p y_{t+i}}{m} = \frac{y_{t-p} + \dots + y_{t-1} + y_t + y_{t+1} + \dots + y_{t+p}}{m}$$

$$m = 2p \quad \bar{y}_t = \frac{1}{2m} (y_{t-p} + 2y_{t-p+1} + \dots + 2y_{t-1} + 2y_t + 2y_{t+1} + \dots + y_{t+p-1} + y_{t+p})$$

### Dekompozice časové řady

$$y_t = T_t + S_t + C_t + \varepsilon_t \quad y_t = T_t S_t C_t \varepsilon_t$$

$$T_t = \beta_0 + \beta_1 t \quad \hat{T}_t = b_0 + b_1 t \quad T_t = \beta_0 + \beta_1 t + \beta_2 t^2 \quad \hat{T}_t = b_0 + b_1 t + b_2 t^2$$

$$T_t = \beta_0 t^{\beta_1} \quad \ln T_t = \ln \beta_0 + \beta_1 \ln t \quad \ln(\hat{T}_t) = \ln b_0 + b_1 \ln t$$

$$MSE = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n (y_t - T_t)^2$$

### Analýza sezónní složky

#### 1. Metoda empirických indexů (délka sezónnosti $r$ )

$$\bar{y}_t \text{ klouzavé průměry délky } r \text{ (například } r = 4) \quad \text{sezónní index}_t = \frac{y_t}{\bar{y}_t}$$

$$\text{průměrný sezónní index}_i = \frac{\sum_{t \text{ z } i\text{-té sezóny}} \text{sezónní index}_t}{\text{počet hodnot z } i\text{-té sezóny}} \quad i = 1, 2, \dots, r \text{ (např. } r = 4)$$

$$\text{standardizovaný sezónní index} = \frac{r}{\sum_{j=1}^r \text{průměrný sezónní index}_j} \cdot \text{průměrný sezónní index}_i$$

#### 2. Regresní metoda s umělými proměnnými (lineární trend, sezónnost délky 4)

$$y_t = T_t + S_t + \varepsilon_t = \beta_0 + \beta_1 t + \alpha_1 x_{1t} + \alpha_2 x_{2t} + \alpha_3 x_{3t} + \varepsilon_t$$

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{4} \quad S_{i+4j} = a_i - \bar{a} \quad i=1,2,3 \quad S_{4+4j} = -\bar{a} \quad \hat{T}_t = (b_0 + \bar{a}) + b_1 t$$

## Indexní analýza

$$I_{t/1} = \frac{y_t}{y_1} = I_{2/1} I_{3/2} \dots I_{t/t-1} \quad I_{t/t-1} = \frac{y_t}{y_{t-1}} = \frac{I_{t/1}}{I_{t-1/1}}$$

$$Q = pq$$

$$I_p = \frac{p_1}{p_0} \quad \Delta p = p_1 - p_0 \quad I_q = \frac{q_1}{q_0} \quad \Delta q = q_1 - q_0 \quad IQ = \frac{Q_1}{Q_0} \quad \Delta Q = Q_1 - Q_0$$

$$I(\Sigma q) = \frac{\sum q_1}{\sum q_0} = \frac{\sum Iq \cdot q_0}{\sum q_0} = \frac{\sum q_1}{\sum \frac{q_1}{Iq}} \quad \Delta(\Sigma q) = \sum q_1 - \sum q_0$$

$$I(\Sigma Q) = \frac{\sum Q_1}{\sum Q_0} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0} = \frac{\sum IQ \cdot Q_0}{\sum Q_0} = \frac{\sum Q_1}{\sum \frac{Q_1}{IQ}} \quad \Delta(\Sigma Q) = \sum Q_1 - \sum Q_0$$

$$I\bar{p} = \frac{\bar{p}_1}{\bar{p}_0} = \frac{\frac{\sum Q_1}{\sum q_1}}{\frac{\sum Q_0}{\sum q_0}} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0} = \frac{\sum \frac{Q_1}{p_1}}{\sum \frac{Q_0}{p_0}} \quad \Delta\bar{p} = \bar{p}_1 - \bar{p}_0 = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum q_1} - \frac{\sum p_0 q_0}{\sum q_0}$$

$$I_p^{(L)} = \frac{\sum \frac{p_1 q_0}{p_0 q_0}}{\sum \frac{p_0 q_0}{p_0 q_0}} = \frac{\sum I_p \cdot p_0 q_0}{\sum p_0 q_0} = \frac{\sum I_p \cdot Q_0}{\sum Q_0} \quad I_p^{(P)} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_1} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum \frac{p_1 q_1}{I_p}} = \frac{\sum Q_1}{\sum \frac{Q_1}{I_p}}$$

$$I_p^{(F)} = \sqrt{I_p^{(L)} \cdot I_p^{(P)}}$$

$$I_q^{(L)} = \frac{\sum \frac{p_0 q_1}{p_0 q_0}}{\sum \frac{p_0 q_0}{p_0 q_0}} = \frac{\sum I_q \cdot p_0 q_0}{\sum p_0 q_0} = \frac{\sum I_q \cdot Q_0}{\sum Q_0} \quad I_q^{(P)} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_1 q_0} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum \frac{p_1 q_1}{I_q}} = \frac{\sum Q_1}{\sum \frac{Q_1}{I_q}}$$

$$I_q^{(F)} = \sqrt{I_q^{(L)} \cdot I_q^{(P)}}$$

$$I(\Sigma Q) = \frac{\sum Q_1}{\sum Q_0} = \frac{\sum p_1 q_1}{\sum p_0 q_0} = \frac{\sum IQ \cdot Q_0}{\sum Q_0} = \frac{\sum Q_1}{\sum \frac{Q_1}{IQ}} \quad \Delta(\Sigma Q) = \sum p_1 q_1 - \sum p_0 q_0$$